



## ŘEZ OVOCNÝCH DŘEVIN

### *Podzimní výsadba*

- kořenová soustava se rychleji obnovuje
- terminál: řez na pupen o  $\frac{1}{2}$  až  $\frac{2}{3}$
- boční výhony: 3 – 4 rovnoměrně rozložené větve po obvodu kmene
- zkrátit nad pupenem směřujícím ven z korunky

### *Jarní výsadba*

- je nutný hlubší řez
- terminál: zkrátit o  $\frac{3}{4}$

## Druhy řezů

### *1. výchovný (tvarovací)*

- řez v prvním roce po výsadbě je nutný proto, aby byla nadzemní a podzemní část v rovnováze. Řez provádíme zásadně na jaře od konce vegetačního klidu až do začátku rašení. Spočívá v odstraňování konkurenčních výhonů a zkracování prodlužujících výhonů hlavních větví. Cílem je zapěstovat pevnou korunu, aby byla schopna unést korunu, což trvá 2 – 4 roky.

### *2. udržovací (obnovovací)*

- provádíme od období plodnosti. Cílem je udržet rovnováhu mezi růstem a plodností. Odstraňujeme jim celé výhony nebo větve, udržujeme požadovaný tvar, obnovujeme plodné dřevo, regulujeme násadu květních pupenů.

### *3. zmlazovací řez*

- uplatňujeme v období stárnutí, které je charakteristické krátkými přírůstky, nepravidelnými výnosy a drobnými plody. Zmlazením prodloužíme živnost o 5 let. Na tento radikální zásah reagují poměrně příznivě jabloně a hrušně, u peckovin je třeba zmlazovat zásadně

v době vegetace (snížení korun třešní při sklizni), aby stromy lépe hojily rány a neutrpěly klejotokem.

## MALINÍK

Výsadba na vzdálenost 2,5 – 3 m x 40 – 60 cm

Řez maliníku spočívá v každoročním odstraňování odplozených, suchých a zahušťujících výhonů, nejlépe ihned po sklizni – *dojde k omezení infekce houbami a k lepšímu vyžrávání zbylých letorostů.*

- a) **Jednoplodící** – Každý rok, hned po sklizni, se těsně u země odříznou odplozené výhony a výhony nepotřebné pro sklizeň v příštím roce.
- b) **Remontantí (vícekrát plodící)** – po podzimním odplození výhony v horní části odumírají, proto se zkracují až k prvnímu dobře vyvinutému pupenu. Ponechává se 10 – 12 výhonů na 1m.

## ANGREŠT

Výsadba – sází se o něco hlouběji než rostl ve školce (o 5 – 10 cm).

Z jara se seřezává na 2 – 4 pupeny (asi 5 cm). Čím slabší výhon, tím hlouběji se řeže, čím silnější výhon, tím mírnější řez. Slabé výhony se odřezávají úplně. V dalším roce se ponechá 4 – 6 nejsilnějších výhonů. Podstatou dalšího tvarování je každoroční doplňování počtu výhonů a jejich zkracování. Počet základních větví má být 8 – 12.

**Přejeme Vám hodně úspěchů a těšíme se na další návštěvu.**